

Informationen zu IMPETIGO CONTAGIOSA (Infektiöse Borkenflechte)

09/2024

Erreger <ul style="list-style-type: none">• Streptococcus pyogenes	Ansteckungsfähigkeit <ul style="list-style-type: none">• Ohne Behandlung bis zu drei Wochen• 24 Stunden nach Beginn einer Antibiotika-Therapie, wenn keine eitrigen Hautveränderungen mehr vorhanden sind, besteht in der Regel keine Ansteckungsgefahr mehr
Infektionsweg/Übertragung <ul style="list-style-type: none">• Kontakt-/Schmierinfektion• Risikofaktor: Enges Zusammenleben in z.B. Schulen, Heimen	Wiederzulassung <ul style="list-style-type: none">• nach Abklingen der Symptome oder• ab dem zweiten Tag nach Beginn der antibiotischen Therapie
Inkubationszeit <ul style="list-style-type: none">• d. R. 1-3 Tage, selten länger	Therapie <ul style="list-style-type: none">• nach Absprache mit dem Arzt antibiotische Therapie möglich
Symptome <ul style="list-style-type: none">• lokale eitrige Infektionen der Haut• insbesondere um Mund und Nase und an den Beinen	

Verhalten

- Personen, die an **Impetigo Contagiosa** erkrankt sind, dürfen **Gemeinschaftseinrichtungen nicht betreten**, solange eine **Ansteckungsfähigkeit** noch gegeben ist.
- Ein **ärztliches Attest** ist **nicht** erforderlich.
- **Eltern** müssen die Einrichtungen über eine Erkrankung ihres Kindes **informieren**.
- **Impetigo contagiosa** ist eine meldepflichtige Erkrankung, die dem Gesundheitsamt **von der Leitung** der Gemeinschaftseinrichtung unverzüglich gemäß § 34 (6) **gemeldet werden** muss.
- Als Hygienemaßnahmen reicht die Routinereinigung und -desinfektion aus.